

Информационное сообщение об эпидемиологической обстановке по чуме на Мадагаскаре по состоянию на 3 ноября 2017 г.

(информация подготовлена 8.11.2017 г.)

По данным ВОЗ на 3 ноября 2017 г. сообщается о 1947 случаях заболевания чумой среди населения, из них 1437 случаев заболевания легочной формы (74,0%), 295 – бубонной (15 %) и 1 – септической (0,1%); 211 случая заболевания неустановленной формы. Зарегистрировано 143 случаев смерти (7,0% случаев смерти). Случаи легочной формы чумы диагностированы в 51 районе страны (из 144). Из 1437 случаев легочной формы чумы подтверждено 364 (25 %) случаев заболевания, 555 (39 %) случаев идентифицированы, как вероятные и еще 518 (36 %) случаев считаются подозрительными на легочную форму чумы. С начала возникновения вспышки заболело чумой 71 медицинских работников. В целом, от вспышки чумы пострадали 16 из 22 (73%) регионов Мадагаскара.


По данным Института Пастера Мадагаскара на 31 октября 2017 г. сообщается о 1838 случаях заболевания чумой среди населения, из них 1138 случаев заболевания легочной формы (61,9%), 265 – бубонной (14,4%) и 5 – септической (0,3%); 430 случая заболевания находятся на рассмотрении (23,4%). Случаи легочной формы чумы диагностированы в 54 районах страны (из 144). Наиболее пострадавшими районами являются: столица страны – город Антананариву, а также портовый город Туамасина. Также заболеваемость регистрируется в Северных и Юго-Восточных регионах страны, которые ранее не считались эндемичными по заболеваемости чумой.

Информация получена:

<https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OEW43-2127102017.pdf>;

<https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ExPlagueMadagascar07112017.pdf>

Динамика заболеваемости чумой на Мадагаскаре, конец сентября–начало ноября
2017 г.



Примечание: отмечена тенденция к снижению заболеваемости, однако прирост числа случаев легочной формы чумы продолжает увеличиваться. Темп роста легочной формы чумы увеличивается, доля легочной формы чумы нарастает.